

# CENTRAL GENERAL HOSPITAL

1234 John Doe Blvd, Sometown, ST 55555 Phone:(111) 222-3333

Name: Doe Jane

Date: 10/20/2008

Address: \_\_\_\_\_

**R  
X**

Hydrocodone/Ibuprofen Tablet 7.5MG-200MG 2 PO Twice  
per day 1 week #28

Refills \*0\*

Void after \_\_\_\_\_

Dr.: \_\_\_\_\_, M.D. / D.O.

DEA #: \_\_\_\_\_

Dispense as written

May Substitute

Prescription is void if more than one (1) prescription is written per blank

**CENTRAL GENERAL HOSPITAL**

1234 John Doe Blvd, Sometown, ST 55555 Phone:(111) 222-3333

Age: 26y Race: Caucasian

Room:

Name: Doe Jane

DOB: 12/31/1981 Sex: F

Acct.#

MR #

**DRUG INFORMATION SHEET**

IBUPROFEN/HYDROCODONE (By mouth)

Hydrocodone Bitartrate (hye-droe-KOE-done bye-tar-trate), Ibuprofen (eye-byoo-PROE-fen)

Treats pain. This medicine is a combination of a narcotic pain reliever and a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID).

Brand Name(s): Vicoprofen

There may be other brand names for this medicine.

When This Medicine Should Not Be Used:

You should not use this medicine if you have had an allergic reaction to hydrocodone, ibuprofen, or to other pain medicines such as aspirin, Aleve(R), Celebrex(R), Darvon(R), Motrin(R), Percocet(R), or Vicodin(R). The reaction may have included wheezing or trouble breathing, hives, rash, or swelling in your face. You should not use this medicine if you have a stomach ulcer, a bleeding disorder. Do not use this medicine right before or right after having coronary artery bypass graft (CABG), a type of heart surgery.

How to Use This Medicine:

Tablet

- \* This medicine should come with a Medication Guide. Read and follow these instructions carefully. Ask your doctor or pharmacist if you have any questions. Ask your pharmacist for the Medication Guide if you do not have one. Your doctor might ask you to sign some forms to show that you understand this information.
- \* Your doctor will tell you how much of this medicine to use and how often. Do not use more medicine or use it more often than your doctor tells you to.
- \* Do not use this medicine for longer than 10 days, unless your doctor tells you to.

If a dose is missed:

- \* If you miss a dose or forget to use your medicine, use it as soon as you can. If it is almost time for your next dose, wait until then to use the medicine and skip the missed dose. Do not use extra medicine to make up for a missed dose.

How to Store and Dispose of This Medicine:

- \* Store the medicine in a closed container at room temperature, away from heat, moisture, and direct light.
- \* Ask your pharmacist, doctor, or health caregiver about the best way to

Name: Doe Jane

DOB: 12/31/1981 Sex: F



**CENTRAL GENERAL HOSPITAL**

1234 John Doe Blvd, Sometown, ST 55555 Phone:(111) 222-3333

Age: 26y	Race: Caucasian	Room:
Name: Doe Jane	DOB: 12/31/1981	Sex: F
Accnt.#	MR #	

dispose of any leftover medicine after you have finished your treatment. You will also need to throw away old medicine after the expiration date has passed.

\* Keep all medicine away from children and never share your medicine with anyone.

**Drugs and Foods to Avoid:**

Ask your doctor or pharmacist before using any other medicine, including over-the-counter medicines, vitamins, and herbal products.

\* Tell your doctor if you are also using dicyclomine (Bentyl(R)), ipratropium (Atrovent(R)), orphenadrine (Flexor(R), Norflex(R)), oxybutynin (Ditropan(R)), scopolamine (Transderm-Scop(R)), tolterodine (Detrol(R)), or trospium (Sanctura(R)). Make sure your doctor knows if you use a blood thinner such as warfarin (Coumadin(R)), or a steroid such as cortisone, dexamethasone, hydrocortisone, methylprednisolone, prednisolone, prednisone, or Orapred(R).

\* Make sure your doctor knows if you also use lithium, methotrexate (Folex(R), Trexall(R)), or a diuretic ("water pill") such as furosemide, hydrochlorothiazide (HCTZ), torsemide, Demadex(R), or Lasix(R). Tell your doctor if you use blood pressure medicine such as captopril, enalapril, lisinopril, Accupril(R), Lotrel(R), Prinivil(R), or Zestril(R). Make sure your doctor knows if you are using a medicine for depression such as amitriptyline, doxepin, nortriptyline, selegiline, tranylcypramine, Elavil(R), Eldepryl(R), Pamelor(R), Parnate(R), or Sinequan(R).

\* Do not use any other NSAID medicine unless your doctor says it is okay. Some other names are aspirin, diclofenac, naproxen, Advil(R), Aleve(R), Celebrex(R), Ecotrin(R), Motrin(R), or Voltaren(R).

\* Tell your doctor if you are using any medicines that make you sleepy. These include sleeping pills, cold and allergy medicine, narcotic pain relievers, and sedatives.

\* Do not drink alcohol while you are using this medicine.

**Warnings While Using This Medicine:**

\* Make sure your doctor knows if you are pregnant or breast feeding. Do not use this medicine during late pregnancy or while you are breast feeding, unless your doctor tells you to.

\* Make sure your doctor knows if you have stomach or intestinal disorders, or if you have ever had an ulcer. Tell your doctor if you have a bladder obstruction or a prostate disorder. This medicine might cause bleeding in your stomach or intestines. These problems can happen without warning signs. This is more likely if you have had a stomach ulcer in the past, if you smoke or drink alcohol regularly, if you are over 60 years old, if you are in poor health, or if you are using certain other medicines (a steroid or a blood thinner).

\* Tell your doctor if you have ever had seizures or a head injury. Make sure your doctor knows if you have asthma, kidney disease, liver disease,





**CENTRAL GENERAL HOSPITAL**

1234 John Doe Blvd, Sometown, ST 55555 Phone:(111) 222-3333

<b>Age:</b> 26y	<b>Race:</b> Caucasian	<b>Room:</b>
<b>Name:</b> Doe Jane	<b>DOB:</b> 12/31/1981	<b>Sex:</b> F
<b>Acct.#</b>	<b>MR #</b>	

\* Vision changes.

If you notice other side effects that you think are caused by this medicine, tell your doctor.

**CENTRAL GENERAL HOSPITAL**

1234 John Doe Blvd, Sometown, ST 55555 Phone:(111) 222-3333

Age: 26y Race: Caucasian

Room:

Name: Doe Jane

DOB: 12/31/1981 Sex: F

Acct.#

MR #

**DRUG INFORMATION SHEET**

IBUPROFEN/HYDROCODONE (Por la boca)

Se usa para tratar el dolor. Este medicamento es una combinacion de un medicamento narcotico para el dolor y de un medicamento antiinflamatorio no esteroide (AINE).

Marca(s): Vicoprofen

Existen muchas otras marcas de este medicamento.

Este medicamento no debe ser usado cuando:

No use este medicamento si alguna vez ha tenido una reaccion alergica a la hidrocodona, ibuprofeno u otros medicamentos para el dolor, como aspirina, Aleve(R), Celebrex(R), Darvon(R), Motrin(R), Percocet(R) o Vicodin(R). En la reaccion alergica se pueden incluir: jadeos o dificultad para respirar, ronchas, salpullido o hinchazon en su cara. Tampoco deberia usarlo, si usted tiene ulcera estomacal o un trastorno hemorragico (sangrado). No use este medicamento inmediatamente antes o inmediatamente despues de un tipo de cirugia en el corazon llamada injerto para bypass de arteria coronaria.

Forma de usar este medicamento:

Tableta

- \* Esta medicina debe venir con una guia de la medicacion. Lea y siga estas instrucciones cuidadosamente. Pregunte a su doctor o farmaceutico si usted tiene cualesquiera preguntas. Preguntele a su farmaceutico por la guia de la medicina si usted no tiene uno. Su doctor puede preguntarle que firme algunas formas para demostrar que usted entiende esta informacion.
- \* Su medico le dira la cantidad de medicamento que usted debe usar y la frecuencia para usarlo. No use mas cantidad de medicamento ni lo use con mas frecuencia de lo ordenado por su medico.
- \* No use este medicamento por mas de 10 dias, a no ser que su medico se lo ordene.

Si una dosis es olvidada:

- \* Si olvida una dosis de su medicamento, uselo lo mas pronto posible. Si es casi hora de su proxima dosis, omita la dosis olvidada y espere hasta entonces para usar el medicamento. No use medicamento adicional para reponer la dosis olvidada.

Forma de guardar y botar este medicamento:

- \* Guarde el medicamento en un recipiente cerrado a temperatura ambiente, alejado del calor, la humedad y la luz directa.
- \* Bote los medicamentos cuya fecha de vencimiento haya expirado y medicamentos que ya no necesita despues de terminado el tratamiento,

Name: Doe Jane

DOB: 12/31/1981 Sex: F



**CENTRAL GENERAL HOSPITAL**

1234 John Doe Blvd, Sometown, ST 55555 Phone:(111) 222-3333

Age: 26y	Race: Caucasian	Room:
Name: Doe Jane	DOB: 12/31/1981	Sex: F
Acct.#	MR #	

siguiendo las instrucciones del farmaceutico, medico o paramedico.

\* Guarde todos los medicamentos fuera del alcance de los ninos y nunca comparta sus medicamentos con otras personas.

Medicamentos y alimentos que debe evitar:

Consulte con su medico o farmaceutico antes de usar cualquier medicamento, incluyendo los que compra sin receta medica, las vitaminas y los productos herbales.

\* Informe a su medico si tambien esta usando diciclomina (Bentyl(R)), ipratropio (Atrovent(R)), orfenadrina (Flexor(R), Norflex(R)), oxibutinina (Ditropan(R)), escopolamina (Transderm-Scop(R)), tolterodina (Detrol(R)) o trospio (Sanctura(R)). No olvide informarle a su medico, si usted esta usando un anticoagulante, como warfarina (Coumadin(R)) o un esteroide, como cortisona, dexametasona, hidrocortisona, metilprednisolona, prednisolona, prednisona u Orapred(R).

\* No olvide informarle a su medico si tambien esta usando litio, metotrexato (Folex(R), Trexall(R)) o un diuretico, como furosemina, hidroclorotiazida (HCTZ), torsemida, Demadex(R) o Lasix(R). Informe tambien, si usted usa medicamentos para la presion arterial, como captopril, enalapril, lisinopril, Accupril(R), Lotrel(R), Prinivil(R) o Zestril(R). Tampoco olvide informarle, si usted esta usando un medicamento para la depresion, como amitriptilina, doxepina, nortriptilina, selegilina, tranilcipromina, Elavil(R), Eldepryl(R), Pamelor(R), Parnate(R) o Sinequan(R).

\* No use ningun otro medicamento AINE a no ser que su medico lo autorice. Algunos otros nombres para estos medicamentos AINE son: aspirina, diclofenaco, naproxeno, Advil(R), Aleve(R), Celebrex(R), Ecotrin(R), Motrin(R) o Voltaren(R).

\* Digale al medico si usted esta usando medicamentos que le producen sueno. Estos incluyen pildoras para dormir, medicamentos para los resfriados y alergias, narcoticos para el dolor y sedantes.

\* No consuma alcohol mientras este usando este medicamento.

Precauciones durante el uso de este medicamento:

\* No olvide informarle a su medico si esta embarazada o dando de lactar (amamantando). No use este medicamento durante la ultima parte del embarazo o mientras este dando de lactar a no ser que su medico se lo ordene.

\* No olvide informarle a su medico si usted tiene problemas estomacales o intestinales o si alguna vez ha tenido una ulcera. Informe tambien, si usted tiene obstruccion en la vejiga o un trastorno prostatico. Este medicamento puede causar un sangrado en su estomago o intestinos. Estos problemas pueden presentarse sin que haya signos de alerta. Esto es mas probable si, anteriormente, usted tuvo una ulcera estomacal, si usted fuma o bebe alcohol con frecuencia, si usted tiene mas de 60 anos, si su estado de salud es deficiente o si esta usando ciertos otros medicamentos (un esteroide o un anticoagulante).

**CENTRAL GENERAL HOSPITAL**

1234 John Doe Blvd, Sometown, ST 55555 Phone:(111) 222-3333

Age: 26y Race: Caucasian

Room:

Name: Doe Jane

DOB: 12/31/1981 Sex: F

Acct.#

MR #

- \* Informe a su medico si alguna vez usted ha presentado convulsiones o sufrido una lesion en la cabeza. No olvide informarle a su medico si usted tiene asma, enfermedad en los rinones o en el higado, enfermedad en los pulmones, lupus, enfermedad de Addison o tiroides hipoactiva. Informe tambien, si usted tiene presion arterial alta, insuficiencia cardiaca congestiva u otros problemas cardiacos o circulatorios.
- \* Este medicamento puede aumentar su riesgo de sufrir un ataque cardiaco o cerebral. Esto es mas probable en personas que ya tienen una enfermedad cardiaca. Las personas que usan este medicamento durante un largo tiempo tambien pueden estar en muy alto riesgo.
- \* Este medicamento puede producirle mareos o sueno. Evite manejar automovil, usar maquinarias, o hacer cualquier otra tarea que pueda ser peligrosa si usted no esta alerta.
- \* Este medicamento puede formar habito. Si usted siente que el medicamento no esta actuando debidamente, no use mas de la dosis prescrita. Llame al medico para que le de instrucciones.
- \* Sera necesario que su medico revise su progreso mediante visitas regulares mientras usted este usando este medicamento. Cumpla sin falta con todas sus citas medicas.

Efectos secundarios que pueden presentarse durante el uso de este medicamento:

Consulte inmediatamente con el medico si nota cualquiera de estos efectos secundarios:

- \* Reaccion alergica: picazon o ronchas, hinchazon en la cara o en las manos, hinchazon o cosquilleo en la boca o garganta, opresion en el pecho, dificultad para respirar.
- \* Heces con sangre o negras y alquitranadas.
- \* Cambios en la cantidad y frecuencia de la orina.
- \* Dolor en el pecho, falta de aliento o expulsion de sangre al toser.
- \* Orina de color oscuro o heces palidas.
- \* Ritmo cardiaco acelerado, rubor o calor en su cara o cuello.
- \* Fiebre, escalofrios, dolor de garganta.
- \* Sintomas parecidos a los de la gripe.
- \* Adormecimiento o debilidad en su brazo o pierna, o en un lado de su cuerpo.
- \* Dolor en la parte inferior (pantorrilla) de su pierna.
- \* Problemas con la vision o problemas para hablar o caminar.
- \* Aumento rapido de peso.
- \* Dolor de estomago severo.
- \* Falta de aliento, sudor frio y piel azulada.
- \* Dolor de cabeza subido o severo.
- \* Hinchazon en sus manos, tobillos o pies.
- \* Vomito con sangre o vomito con aspecto de cafe molido.
- \* Color amarillo en su piel o en las partes blancas de sus ojos.

Consulte con el medico si nota los siguientes efectos secundarios menos graves:

Name: Doe Jane

DOB: 12/31/1981 Sex: F



**CENTRAL GENERAL HOSPITAL**

1234 John Doe Blvd, Sometown, ST 55555 Phone:(111) 222-3333

<b>Age:</b> 26y	<b>Race:</b> Caucasian	<b>Room:</b>
<b>Name:</b> Doe Jane	<b>DOB:</b> 12/31/1981	<b>Sex:</b> F
<b>Acct.#</b>	<b>MR #</b>	

- \* Estrenimiento, diarrea o gases.
- \* Dolor de cabeza, nerviosismo, ansiedad.
- \* Aumento del sudor.
- \* Nauseas moderadas o vomito, malestar estomacal o dolor de estomago, leves.
- \* Picazon leve en la piel.
- \* Tintineo en sus oidos.
- \* Debilidad anormal, somnolencia inusual o dificultad para dormir.
- \* Cambios en la vision.

Consulte con el medico si nota otros efectos secundarios que cree son causados por este medicamento.